



# 有害事象

有害事象	GEM	GEM/CDDP
白血球減少	11.0%	15.1%
血小板減少	8.0%	8.2%
ヘモグロビン減少	3.7%	6.3%
好中球減少	17.9%	22.6%
ビリルビン上昇	13.1%	10.7%
AST上昇	18.1%	9.6%
食欲不振	2.5%	1.9%
倦怠感	16.6%	18.6%
腎機能不全	1.2%	1.9%
嘔吐	3.0%	5.1%
便秘	1.8%	1.3%
下痢	2.5%	4.5%
疼痛	7.5%	9.0%
Any events	65.5%	64.2%

- Cis-Gem併用化学療法は、有意に生存期間を改善した。
- 有害事象は両群で大きな差がなかった。
- GEM+CDDPは進行胆道癌の世界的な標準治療として推奨される。
- 今後の臨床試験における基準となる。

# 当院における進行胆道癌の治療

- 2006年10月～2009年11月
- 42症例(男/女 18/24 年齢73.6歳)
- 肝内胆管癌 17例
- 肝外胆管癌 12例
- 乳頭部癌 1例
- 胆嚢癌 12例

# 治療法

- Gem 17例
- Gem+CDDP 2例
- Gem+S-1 6例
- S-1 2例
- S-1+CDDP 1例
- UFT 2例
- 支持療法 12例



